

La LACTATION

Action ruminale et hépatique



HEPATO GR UAB

Action hépatique.

POIDS : 25 KG GRANULÉ

CODE PRODUIT : 7741

OBSERVATION

Manque d'appétit, transition alimentaire, charge hépatique.

UTILISATION

20g/jour/chèvre laitière pendant 5 jours.

INTÉRÊT : Réduction du risque de cétose, puissant drainage du foie.

GARANTIES EN %

Calcium : 24

Sodium : 3

ADDITIFS EN mg AU Kg

SUBSTANCES AROMATIQUES (produits naturels à base de plantes) : 32 340



HEPATO DTX

Action hépatique.

POIDS : 10 ET 20 KG POUDRE

CODE PRODUIT : 1405

OBSERVATION

Manque d'appétit, transition alimentaire, charge hépatique.

UTILISATION

10g/jour/chèvre laitière pendant 5 jours.

INTÉRÊT : Réduction du risque de cétose, puissant drainage du foie.

GARANTIES EN %

Calcium : 16

Sodium : 1

Magnésium : 6

ADDITIFS EN mg AU Kg

Méthionine : 150 000

Choline : 100 000

Sorbitol : 50 000



MINER'AIL 152 UAB

Eloigne les insectes. Antioxydant naturel. Utilisable en agriculture biologique.

POIDS : COULÉ 20 KG

CODE PRODUIT : 7497

GARANTIES EN %

Phosphore : 4

Sodium : 8

Calcium : 8

Magnésium : 5

OLIGO ÉLÉMENTS EN mg/Kg

Cuivre : 500

Sélénium : 15

Zinc : 4 000

Iode : 60

Manganèse : 1 800

Cobalt : 30

NB : Cet aliment minéral contient 0,9% de soufre total

* Ail de qualité supérieur spécifiquement sélectionné et analysé, sans arôme, utilisable sur chèvre.

Défense immunitaire



SELEIODE 152

Augmentation du statut immunitaire.

POIDS : 8 À 20 KG GRANULÉ

CODE PRODUIT : 1452

OBSERVATION

Augmentation du statut immunitaire, cellules, état grippal, cabri mou.

UTILISATION

5g/chèvre laitière/jour pendant 5 jours.

INTÉRÊT : Détoxification cellulaire (diminution du taux cellulaire), augmentation des fonctions immunitaires.

ADDITIFS EN mg AU Kg

Sélénium : 40 dont Sél. organique : 10

Iode : 2 500

Vit. C : 1 000

Vit. E : 4 000 dont AO 152 : 500

Vit. D3 : 180 000 UI

Vit. A : 1 000 000 UI

Parasitisme Réduction de la pression parasitaire

CPH VERMI

Gestion de la pression parasitaire.

GRANULÉ

CODE PRODUIT : 1478

OBSERVATION

Baisse de production laitière, anorexie, amaigrissement.

UTILISATION

30 g/jour, pendant 5 jours.

INTÉRÊT : Modifie les conditions du milieu utile pour le développement des parasites aussi bien les nématodes (strongles digestifs) que les trématodes (petites et grandes douves). Zéro délai d'attente pour le lait et la viande. Sans risque pour l'éleveur et les animaux. Distribution facile.

