

Réduction des risques acétonémie et hépatique



HEPATO DTX

Action hépatique.

POIDS : 10 KG ET 20 KG POUDRE CODE PRODUIT : 1405

OBSERVATION
Manque d'appétit, transition alimentaire, charge hépatique.

UTILISATION
100g/jour pendant 5 jours.

INTÉRÊT : Réduction du risque de cétose. Puissant drainage du foie.

GARANTIES EN %		
Calcium : 16	Sodium : 1	Magnésium : 6
ADDITIFS EN mg AU Kg		
Méthionine : 150 000	Choline : 133 800	Sorbitol : 50 000



CPH L

Double action.
Action ruminale et action hépatique.

POIDS : 25 KG POUDRE CODE PRODUIT : 1401

OBSERVATION
Manque d'appétit, faible capacité d'ingestion, démarrage de lactation insuffisant, état grippal.

UTILISATION
100g/jour pendant 10 jours de CPH L ou 100g/jour pendant 3 jours/semaine en discontinu.

INTÉRÊT : Activateur ruminale, drainage du foie, apport de vitamines, qualité fromagère.

GARANTIES EN %		
Protéines brutes : 28	Cendres brutes : 13	Matières grasses brutes : 5
Cellulose brute : 5	Humidité : 10	
ADDITIFS EN mg AU Kg		
Saccharomycines Cerevisiae : 180.10 ⁹ CFU	Méthionine : 50 000	
Vitamine A : 1 000 000 UI	Vitamine E : 1 000	Vitamine C : 10 000
Choline : 20 000	Vitamine D3 : 120 000 UI	Sorbitol : 100 000

* Complexe de plantes



Gestion de la pression parasitaire

CPH VERMI 152

Gestion de la pression parasitaire.


POIDS : 10 KG ET 25 KG GRANULÉ CODE PRODUIT : 1478

OBSERVATION : Poils destructurés, baisse de production laitière, bouses liquides, anorexie, amaigrissement.

UTILISATION : 200g/jour pendant 5 jours.



Parasitisme interne digestif



INTÉRÊT : Gestion de la pression parasitaire. Modifie les conditions du milieu utile pour le développement des parasites aussi bien les nématodes (strongles digestifs) que les trématodes (petites et grandes douves, paramphystome). **Zéro délai d'attente** pour le lait et la viande, distribution facile, sans risque pour l'éleveur et les animaux.

Réduction du risque d'acidose



LEVUPRO 152

Action ruminale.

POIDS : 25 KG SEMOULE CODE PRODUIT : 2340

OBSERVATION
Ration déficitaire en fibres mécaniques, mauvaise rumination (inférieur à 60 coups de machoire par cycle), capacité d'ingestion réduite (inférieur à 18kg de M.S. ingérée), consommation irrégulière d'un jour à l'autre.

UTILISATION
100g/vache/jour en continu pendant la lactation.

INTÉRÊT : Réduction du risque de subacidose, augmente la capacité d'ingestion et la production laitière, sécurise et optimise les rations déficitaires en fibres, valorisation des taux protéiques, qualité fromagère.

ADDITIFS EN mg AU Kg
Saccharomycines Cerevisiae : 500x10 ⁹ CFU

Levures vivantes + argiles



CPH TAMPON

Régulateur de pH.

POIDS : 25 KG POUDRE CODE PRODUIT : 1475

OBSERVATION
Ration riche en amidon, taux inversés, bouses liquides, acidose métabolique.

UTILISATION
Minimum 200g/vache laitière/jour en continu pendant la lactation.
NB : à utiliser uniquement pendant la lactation

INTÉRÊT : Sécurise la ration, ralentit le transit, réduction des acidoses métaboliques.

GARANTIES EN %	
Phosphore : Néant	Sodium : 8
Calcium : 18	Magnésium : 5
ADDITIFS EN mg AU Kg	
Sorbitol : 30 000	

LAITIÈRE
 ALLAITANT
 CAPRIN
 ÉQUIN
 BIO
 AGROCLEAN